

Esempio di riscrittura secondo Information Mapping®

Decorso postoperatorio (Testo originale)

Prima di lasciare il centro chirurgico viene consegnato un foglio con le istruzioni dei farmaci da utilizzare. Il paziente deve iniziare le cure entro un paio d'ore dall'intervento, deve cioè iniziare a prendere le pillole e i colliri prescritti dal chirurgo. Il paziente non deve mai sospendere le cure (colliri o pillole) a meno che sia il chirurgo a dirlo; esse aiutano l'occhio operato a guarire meglio ed a prevenire complicazioni. In caso di dubbi sulla modalità del corso postoperatorio, il paziente deve contattare uno dei componenti dell'equipe chirurgica

Nella grande maggioranza dei casi, l'occhio operato di cataratta non presenta dolore dopo l'intervento, può però avere sensazioni di corpo estraneo, bruciore, fastidio; inoltre, può vedere rosso o vedere i colori alterati. Le cure locali postoperatorie consistono nell'instillazione di gocce, e nell'applicazione di una protezione oculare secondo le modalità e per un periodo di tempo che le saranno spiegati dal suo chirurgo. È necessario a volte procedere all'asportazione dei fili di sutura (quando applicati durante l'intervento).

La vista migliora con relativa rapidità che dipende dalla situazione clinica preoperatoria ma già dopo qualche giorno può venir prescritta una correzione adatta con occhiali provvisori.

L'attività professionale, l'uso di macchine o di strumenti pericolosi, la guida dell'auto sono sconsigliati per un periodo di tempo di alcuni giorni che sarà meglio definito dal suo oculista in sede di visita post-operatoria da programmare.

Nel 20% circa dei casi, può verificarsi, negli anni successivi all'intervento, una opacizzazione della capsula (l'involucro del cristallino): è la "cataratta secondaria" responsabile di un nuovo calo della vista. Il trattamento consiste nel realizzare un'apertura della capsula tramite il laser o la chirurgia che ha progettato l'impianto.

Dopo l'intervento

(testo rivisto secondo Information Mapping®)

Attività da evitare

Dopo l'intervento, deve evitare di:

- guidare
- utilizzare macchine o strumenti pericolosi, e
- riprendere l'attività lavorativa.

Nota: durante la visita post-operatoria, il suo oftalmologo le dirà quando sarà possibile riprendere le normali attività.

Benefici

In base alla sua condizione prima dell'intervento, la sua vista migliorerà gradualmente e presto le potranno essere prescritti occhiali provvisori adatti alla sua nuova condizione.

Fastidi

Dopo l'intervento, potrà provare:

- dolore moderato
 - sensazione di corpo estraneo nell'occhio
 - bruciore, e/o
 - alterazione dei colori.
-

Che cosa fare

Prima di lasciare l'ospedale:

- si assicuri di aver ricevuto un foglio con le istruzioni riguardanti l'uso dei farmaci

Dopo due ore dall'intervento:

- cominci a prendere le pillole, e
- i colliri prescritti dal medico.

Durante il periodo post operatorio, secondo le modalità e i tempi indicati dal medico, dovrà:

- instillare gocce di collirio nell'occhio, e
- applicare una protezione oculare
- farsi rimuovere i punti di sutura, se applicati.

Importante: Non sospenda mai le cure, salvo diversa indicazione del suo medico.

Contatto

In caso di dubbi sulle modalità del corso post operatorio, contatti uno dei componenti dell'équipe chirurgica.

Cataratta secondaria

Che cos'è

Nel 20% circa dei casi, può verificarsi, negli anni successivi all'intervento, una opacizzazione della capsula (l'involucro del cristallino): è la cataratta secondaria, responsabile di un nuovo calo della vista.

Trattamento

Il trattamento consiste nel realizzare un'apertura della capsula tramite il laser o la chirurgia che ha progettato l'impianto.